

Aufgabe 1 (45 Minuten):

Das Polynom vierten Grades

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

besitzt zwei reelle Nullstellen, die erste \bar{x}_1 im Intervall $[-1, 0]$ und die zweite \bar{x}_2 im Intervall $[0, 1]$.

a) Versuchen Sie, diese Nullstellen mit einer Fixpunktiteration $x_{n+1} \equiv F(x_n)$ bis auf 10^{-6} genau zu bestimmen. Stellen Sie dafür die entsprechende Fixpunktgleichung $F(x) = x$ auf und wählen Sie geeignete Startwerte gemäss der Abbildung. Was stellen Sie bzgl. der Nullstelle in $[0, 1]$ fest? Weshalb?

$$\begin{array}{l} f(x) = 0 \\ 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9 = 0 \quad | + 221x \\ 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9 = 221x \quad | : 221 \\ F(x) = \frac{230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9}{221} = x \end{array}$$

Startwert x_0 : -1

Nullstelle x_n : -0.04065928831575886

Es gibt keinen Startpunkt um die Nullstelle im Intervall $[0, 1]$ zu finden.

b) $F(x)$ erreicht auf dem Intervall $[-0.5, 0.5]$ sein Minimum für $x = 0$ und sein Maximum für $x = 0.5$. $|F'(x)|$ wird maximal für $x = 0.5$. Zeigen Sie, dass für den ersten Fixpunkt \bar{x}_1 auf dem Intervall $[-0.5, 0.5]$ die Bedingungen des Banachschen Fixpunktsatzes erfüllt sind und bestimmen Sie α .

c) Wie häufig müssten Sie gemäss der a-priori Fehlerabschätzung iterieren, damit der absolute Fehler für \bar{x}_1 kleiner als 10^{-9} wird? Entspricht das der Realität?

